

BİTKİ ADI

Sebzeler: Domates, Biber, Patlıcan, Hiyar, Kabak, Fasulye, Bezelye, Berniye, Ispanak, Enginar v.s

Meyveler: Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt v.s

Meyve Ağaçları: Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Badem, Ayva, Nar, Zeytin v.s

Çilek, Ahududu, Yaban Mersini

Fındık, Ceviz, Badem

Muz

Bağ (üzüm)

Hububat: Buğday, Arpa, Çeltik, Mercimek, Nohut v.s

Kavun, Karpuz

Pamuk

Ayçiçeği, Mısır, Tütün, Kanola

Soğan, Sarmısak, Patates, Turp, Şeker Pancarı, Havuç, Lahana, Marul

Kesme Çiçekçilik

Damla Sulama ve Salma Sulama Sistemleri ile Dekara (1-1.5 kg) Uygulama Yapılır.

Yapraktan Uygulama Dozu ve Uygulama Bıçımı

100-150 g/da Meyve dönemi başlangıcından hasat sonuna kadar 2-3 uygulama yapılır.

150-200 g/100 L su Çiçeklenme öncesi ilk uygulama yapılır, 30 gün arayla 3 uygulama daha yapılır.

150-200 g/100 L su Meyve bağlama, büyüme ve hasat öncesi kadar 2-3 uygulama yapılır.

100-150 g/da Çiçek öncesi ve Meyve bağlama döneminde 2-3 uygulama yapılır.

150-200 g/100 L su Çiçek öncesi, bıyık atma ve çiçeklenme döneminde 2-3 uygulama yapılır.

150-200 g/100 L su Meyve oluşumu öncesi ve sonrası 2-3 uygulama yapılır.

150-200 g/100 L su Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır.

150-200 g/da Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır.

150-200 g/da Kol atımından sonra 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

150-200 g/da Tarak öncesi ve sonrası 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

150-200 g/da Bitki boyu 20-25 cm olunca 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

150-200 g/da Çapaadan 15 gün sonra 1-2 uygulama yapılır.

100-150 g/da Yapraklanma dönemi ve sonrasında 2-3 uygulama yapılır.



EC FERTİLİZER

Demir (Fe-Sülfat), Manganez (Mn-Sülfat) ve Çinko (Zn-Sülfat) SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARİŞİMİ

macro
KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

MacroCrop

Garanti Edilen İçerik..... W/W

Suda Çözünür Demir (Fe)..... %3.0

Suda Çözünür Manganez (Mn)..... %1.0

Suda Çözünür Çinko (Zn)..... %2.0



MacroCrop

Depolama Şartları: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.

Depolama sıcaklığı: +5°C ile +45°C arasında olmalıdır.

Kullanım ile ilgili Uyarılar: Gözler, deri ve elbiselerinize bulaşma masına dikkat ediniz. Bulaşması durumunda bol su ve sabunla yıkayınız. Uygulama esnasında hiçbir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz. Ağız yolu ile bulaşma durumunda, zehirlenme belirtileri görürseniz hasta kusturulmalı ve doktor çağrılmalıdır. Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. **Toprak ve veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla uygun dozlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.**

Çözünürlüğü ve Karışabilirliği: Suda tavsiye edilen dozlarda çözünür, çökmez ve kalıntı bırakmaz. Yüksek alkali, yüksek asitli haricinde pestisit ve gübrelerle karışabilir. Kullanmadan önce karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.

Firma Beyanı: Üretici firma, tavsiyelere uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak depolama şartları, hatalı kullanımı ve karışımın dolaylı doğabilecek olumsuzluklar firmamızın garantisini dışındadır.

macro
KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Üretici Firma: MACROSAN KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Onur Mah. Zambak Sk. No: 39/A Balçova / İzmir / Türkiye

Tel: +90 232 279 20 49 • www.macro.com.tr



Lisans No: - Tescil No: XXXXXXXXX

Son Kullanma Tarihi imal tarihinden itibaren 5 yıldır.

ÜRT:

SKT:

PNO:

NET AĞIRLIĞI:

İbrahim Tolga ULUŞAN
MACROSAN KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
ONUR MAH. ZAMBAK SK. PAZARTEPE
NO:39A - Z BALÇOVA / İZMİR
V.NO: 699072471

Piyasaya sunacağımız bu ürünün üzerindeki etiket bilgilerinin aynı olacağını taahhüt ederiz. Aksini tesbiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yasal işlemleri peşinen kabul ederiz.

EC FERTİLİZER

Demir(Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat) ve Çinko (Zn-Sülfat)
SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

macrosan
KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

MacroCrop

Garanti Edilen İçerik

W/W

Suda Çözünür Demir (Fe)	%3.0
Suda Çözünür Mangan (Mn).....	%1.0
Suda Çözünür Çinko (Zn).....	%2.0



MacroCrop

macrosan
KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

BİTKİ ADI	Yapraktan Uygulama Dozu ve Uygulama Bıçımı
Setzeler: Domates, Elber, Patlıcan, Hyar, Kabak, Fasulye, Bezelye, Banya, Ispanak, Enginar v.s	100-150 g/da Meyve dönemi başlangıcından hasat sonuna kadar 2-3 uygulama yapılır.
Narenciye: Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt v.s	150-200 g/100 L su Çiçeklenme öncesi ilk uygulama yapılır. 30 gün arayla 3 uygulama daha yapılır.
Meyve Ağaçları: Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Badem, Ayra, Nar, Zeytin v.s	150-200 g/100 L su Meyve bağlama, büyüme ve hasat öncesi kadar 2-3 uygulama yapılır.
Çilek, Ahududu, Yaban Mersini	100-150 g/da Çiçek öncesi ve Meyve bağlama döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Fındık, Ceviz, Badem	150-200 g/100 L su Çiçek öncesi, bıyık atma ve iç bağlama döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Muz	150-200 g/100 L su Meyve oluşumu öncesi ve sonrası 2-3 uygulama yapılır.
Bağ (Özüm)	150-200 g/100 L su Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Hububat: Buğday, Arpa, Çeltik, Mercimek, Nohut v.s	150-200 g/da Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Kavun, Karpuz	150-200 g/da Koli atımından sonra 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.
Pamuk	150-200 g/da Tarak öncesi ve sonrası 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.
Ayçiçeği, Mısır, Tütün, Kanola	150-200 g/da Bitki boyu 20-25 cm olunca 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.
Soğan, Samanık, Pırasa, Patates, Turp, Şeker Pancarı, Havuç, Lahana, Marul	150-200 g/da Çiçekten 15 gün sonra 1-2 uygulama yapılır.
Kesme Çiçekçilik	100-150 g/da Yapraklanma dönemi ve sonrasında 2-3 uygulama yapılır.

Damlı Sulama ve Salma Sulama Sistemleri ile Dekara (1-1,5 kg) Uygulama Yapılır.

Depolama Şartları: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerde) muhafaza edilir. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.

Depolama sıcaklığı +5°C ile +45°C arasında olmalıdır.

Kullanıma İlgili Uyarılar: Gözler, deri ve elbiselerinize bulaşmamasına dikkat ediniz. Bulaşması durumunda bol su ve sabunla yıkayınız. Uygulama esnasında hiçbir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz. Ağız yolu ile bulaşma durumunda, zehirlenme belirtileri görülürse hasta kusturulmalı ve doktor çağırılmalıdır. Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

Toprak ve/veya yaprak analizi yapılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla uygun dozlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

Çözünürlüğü ve Karışılabilirlik: Suda tavsiye edilen dozlarda çözünür, çökmez ve kalıntı bırakmaz. Yüksek alkali, yüksek asitli haricinde pestisit ve gübrelerle karışabilir. Kullanmadan önce karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.

Firma Beyanı: Üretici firma, tavsiyelere uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak depolama şartları, hatalı kullanım ve karışımın dolaylı doğabilecek olumsuzlukları firmamızın garantisidir.

macrosan
KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Üretici Firma: MACROSAN KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Onur Mah. Zambak Sk. No: 39/A Balçova / İzmir / Türkiye

Tel: +90 232 279 20 49 - www.macrosan.com.tr



Lisans No: • **Tescil No:** XXXXXXXXXX

Son Kullanma Tarihi imal tarihinden itibaren 5 yıldır.

ÜRT:

SKT:

PNO:

NET AĞIRLIĞI:

Piyasaya sunacağımız bu ürünün üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt ederiz. Aksini tesbiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yasal işlemleri peşinen kabul ederiz.