

BİTKİ ADI

Yapraktan Uygulama Dozu ve Uygulama Biçimi

Selbzeler: Domates, Biber, Patlıcan, Hiyar, Kabak, Fasulye, Bezelye, Berniye, Ispanak, Enginar v.s

Meyve dönemi başlangıcından hasat sonuna kadar 2-3 uygulama yapılır.

Narenciye: Portakal, Limon, Mandarın, Greyfurt v.s

Çiçeklenme öncesi ilk uygulama yapılır. 30 gün arayla 3 uygulama daha yapılır.

Meyve Ağaçları: Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Badem, Ayva, Nar, Zeytin v.s

Meyve bağlama, büyüme ve hasat öncesine kadar 2-3 uygulama yapılır.

Çilek: Ahududu, Yaban Mersini

Çiçek öncesi ve Meyve bağlama döneminde 2-3 uygulama yapılır.

Fındık, Ceviz, Badem

Çiçek öncesi, bıyık atma ve iç bağlama döneminde 2-3 uygulama yapılır.

Muz

Meyve oluşumu öncesi ve sonrası 2-3 uygulama yapılır.

Bağ (üzüm)

Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır.

Hulubut: Buğday, Arpa, Çeltik, Mercimek, Nohut v.s

Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır.

Kavun, Karpuz

Kol atımdan sonra 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

Pamuk

Tarak öncesi ve sonrası 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

Ayoçiçeği, Mısır, Tütün, Kanola

Bitki boyu 20-25 cm olunca 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

Soğan, Sarmısak, Prasa, Patates, Turp, Şeker Pancarı, Havuç, Lahana, Marul

Çapa 15 gün sonra 1-2 uygulama yapılır.

Kesme Çiçekçilik

Yapraklanma dönemi ve sonrasında 2-3 uygulama yapılır.

Damia Sulama ve Salma Sulama Sistemleri ile Dekara (1-1,5 kg) Uygulama Yapılır.

EC FERTİLİZER

KALSİYUM Klorür ÇÖZELTİSİ

macro

KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

MacroCal-B

Garanti Edilen İçerik

W/W

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)..... %15

Suda Çözünür Bor (B)..... %0.2



MacroCal-B

Depolama Şartları: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.

Depolama sıcaklığı: +5°C ile +45°C arasında olmalıdır.

Kullanım ile ilgili Uyarılar: Gözler, deri ve elbiselerinizde bulaşma masına dikkat ediniz. Bulaşması durumunda bol su ve sabunla yıkayınız. Uygulama esnasında hiçbir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz. Ağız yolu ile bulaşma durumunda, zehirlenme belirtileri görürse hasta kusturulmalı ve doktor çağrılmalıdır. Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. **Toprak ve veya yaprak analizi yapılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla uygun dozlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Kloru hassas bitkilerde kullanımına dikkat ediniz!**

Çözünürlüğü ve Karşılabilirlik: Suda tavsiye edilen dozlarda çözünür, çökmez ve kalıntı bırakmaz. Yüksek alkali, yüksek asitli haricinde pestisit ve gübrelere karşıdır. Kullanmadan önce karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.

Firma Beyanı: Üretici firma, tavsiyelere uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak depolama şartları, hatalı kullanım ve karışımın dolaylı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışıdadır.

macro

KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Üretici Firma: MACROSAN KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Onur Mah. Zambak Sk. No: 39/A Balçova / İzmir / Türkiye

Tel: +90 232 279 20 49 • www.macroasan.com.tr



Lisans No: • Tescil No: XXXXXXXXX

Son Kullanma Tarihi imal tarihinden itibaren 5 yıldır.

ÜRT:

SKT:

PND:

NET AĞIRLIĞI:

İbrahim Tolga ULUŞAN

MACROSAN KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
ONUR MAH. ZAMBAK SK. PALMİYE
NO:39A - Z BALÇOVA/ İZMİR
V.NO: 6090072471

Piyasaya sunacağımız bu ürünün üzerindeki etiket bilgilerinin aynı olacağını taahhüt ederiz. Aksini tesbiti halinde 7723 sayılı kanuna göre hakkımızda yasal işlemleri peşinen kabul ederiz.

EC FERTİLİZER
KALSİYUM Klorür ÇÖZELTİSİ

macrosan
KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

MacroCal-B

Garanti Edilen İçerik

W/W

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) %15
Suda Çözünür Bor (B) %0.2



MacroCal-B

macro
KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Bitki Adı	Yapraktan Uygulama Dozu ve Uygulama Biçimi
Selzeler: Domates, Biber, Patlıcan, Hyar, Kabak, Fasulye, Bezelye, Bamya, Ispanak, Enginar v.s	150-200 g/da Meyve dönemi başlangıcından hasat sonuna kadar 2-3 uygulama yapılır.
Narenciye: Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt v.s	200-250 g/100 L su Çiçeklenme öncesi ilk uygulama yapılır. 30 gün araya 3 uygulama daha yapılır.
Meyve Ağaçları: Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Badem, Ayva, Nar, Zeytin v.s	200-250 g/100 L su Meyve bağlama, büyüme ve hasat öncesine kadar 2-3 uygulama yapılır.
Çilek, Ahududu, Yaban Mersini	150-200 g/da Çiçek öncesi ve Meyve bağlama döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Fındık, Ceviz, Badem	200-250 g/100 L su Çiçek öncesi, bükü atma ve iç bağlama döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Muz	200-250 g/100 L su Meyve oluşumu öncesi ve sonrası 2-3 uygulama yapılır.
Bağ (Özüm)	200-250 g/100 L su Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Hububat: Buğday, Arpa, Çeltik, Mercimek, Nohut v.s	200-250 g/da Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Kavun, Karpuz	200-250 g/da Koli atminden sonra 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.
Pamuk	200-250 g/da Tarak öncesi ve sonrası 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.
Ayçiçeği, Mısır, Tütün, Kanola	200-250 g/da Bitki boyu 20-25 cm olunca 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.
Soğan, Sarımsak, Prasa, Patates, Turp, Şeker Pancarı, Havuç, Lahana, Marul	200-250 g/da Çapadan 15 gün sonra 1-2 uygulama yapılır.
Kesme Çiçekçilik	150-200 g/da Yapraklanma dönemi ve sonrasında 2-3 uygulama yapılır.

Damlı Sulama ve Sulama Sulama Sistemleri İle Dekara (1-1,5 kg) Uygulama Yapılır.

Depolama Şartları: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.

Depolama sıcaklığı: +5°C ile +45°C arasında olmalıdır.

Kullanım İliqli Uyarılar: Gözler, deri ve elbiselerinize bulaşmamasına dikkat ediniz. Bulaşması durumunda bol su ve sabunla yıkayınız. Uygulama esnasında hiçbir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz. Ağzı yolu ile bulaşma durumunda, zehirlenme belirtileri görürse hasta kurturulmalı ve doktor çağrılmalıdır. Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla uygun dozlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

Kloro hassas Bitkilerde kullanımına dikkat ediniz!

Çözünürlüğü ve Karşıabilirlik: Suda tavsiye edilen dozlarda çözünür, kökmez ve kalıntı bırakmaz. Yüksek alkali, yüksek asitli haricinde pestisit ve gübrelere karşıabilir. Kullanmadan önce karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.

Firma Beyanı: Üretici firma, tavsiyelere uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak depolama şartları, hatalı kullanım ve karışımından dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisidir.

macrosan
KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Üretici Firma: MACROSAN KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: Onur Mah. Zambak Sk. No: 39/A Balçova / İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 278 20 48 • www.macroasan.com.tr



Lisans No: - **Tescil No:** XXXXXXXXX

Son Kullanma Tarihi imal tarihinden itibaren 5 yıldır.

ÜRT:
SKT:
PNO:
NET AĞIRLIĞI:

İbrahim Tolga ULUŞAN

MACROSAN KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
ONUR MAH. ZAMBAK SK. PALMIYE
NO:39A - Z BALÇOVA/ İZMİR
V.NO: 6090072471

Piyasaya sunacağımız bu ürünün üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt ederiz. Aksini tesbiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yasal işlemleri peşinen kabul ederiz.