

Bitki Adı

Yapraktan Uygulama Dozu ve Uygulama Bıçımı

Selzeler: Domates, Biber, Patlıcan, Hiyar, Kabak, Fasulye, Bezelye, Berniye, Ispanak, Enginar v.s

75-125 g/da

Meyve dönemi başlangıcından hasat sonuna kadar 2-3 uygulama yapılır.

Narenciye: Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt v.s

100-150 g/100 L su

Çiçeklenme öncesi ilk uygulamaya yapılır, 30 gün arayla 3 uygulamaya daha yapılır.

Meyve Ağaçları: Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Badem, Ayva, Nar, Zeytin v.s

100-150 g/100 L su

Meyve bağlama, büyüme ve hasat öncesi 2-3 uygulamaya yapılır.

Çilek, Ahududu, Yaban Mersini

75-125 g/da

Çiçek öncesi ve Meyve bağlama döneminde 2-3 uygulamaya yapılır.

Fındık, Ceviz, Badem

100-150 g/100 L su

Çiçek öncesi, bıyık atma ve çiçeklenme döneminde 2-3 uygulamaya yapılır.

Muz

100-150 g/100 L su

Meyve oluşumu öncesi ve sonrası 2-3 uygulamaya yapılır.

Bag (üzüm)

100-150 g/100 L su

Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulamaya yapılır.

Hububat: Buğday, Arpa, Çeltik, Mercimek, Nohut v.s

100-150 g/da

Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulamaya yapılır.

Kavun, Karpuz

100-150 g/da

Kol atımdan sonra 15 gün ara ile 2-3 uygulamaya yapılır.

Pamuk

100-150 g/da

Tarak öncesi ve sonrası 15 gün ara ile 2-3 uygulamaya yapılır.

Ayçiçeği, Mısır, Tütün, Kanola

100-150 g/da

Bitki boyu 20-25 cm olunca 15 gün ara ile 2-3 uygulamaya yapılır.

Soğan, Sarımsak, Patates, Turp, Şeker Pancarı, Havuç, Lahana, Marul

100-150 g/da

Çapa 15 gün sonra 1-2 uygulamaya yapılır.

Kesme Çiçekçilik

75-125 g/da

Yapraklanma dönemi ve sonrasında 2-3 uygulamaya yapılır.

Damla Sulama ve Salma Sulama Sistemleri ile Dekara (0.5-1 kg) Uygulama Yapılır.

EC FERTİLİZER

NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

macroFos-N

KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

MacroFos-N

5-25-0 + ME

Garanti Edilen İçerik

W/W

Toplam Azot (N) %5

Üre Azotu (NH₂) %5

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) %25

Suda Çözünür Çinko (Zn) %5



MacroFos - N

5-25-0 + ME

Depolama Şartları: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı +5°C ile +45°C arasında olmalıdır. TAHRİŞ EDİCİDİR.**

Kullanımına İlgili Uyarılar: Gözler, deri ve elbiselerinize bulaşmasına dikkat ediniz. Bulaşması durumunda bol su ve sabunla yıkayınız. Uygulama esnasında hiçbir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz. Ağız yolu ile bulaşma durumunda, zehirlenme belirtileri görürse hasta kusturulmalı ve doktor çağrılmalıdır. Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. **Toprak ve veya yaprak analizi yapılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla uygun dozlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.**

Çözünürlüğü ve Karışabilirliği: Suda tavsiye edilen dozlarda çözünür, çökmez ve kalıntı bırakmaz. Yüksek alkali, yüksek asitli haricinde pestisit ve gübrelere karışabilir. Kullanmadan önce karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.

Firma Beyanı: Üretici firma, tavsiyelere uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak depolama şartları, hatalı kullanımı ve karışımın dolaylı doğabilecek olumsuzluklar firmamızın garantisini dışındadır.

macroFos

KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Üretici Firma: MACROSAN KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Onur Mah. Zambak Sk. No: 39/A Balçova / İzmir / Türkiye

Tel: +90 232 279 20 49 • www.macroFos.com.tr



Lisans No: - Tescil No: XXXXXXXXX

Son Kullanma Tarihi imal tarihinden itibaren 5 yıldır.

ÜRT:

SKT:

PNO:

NET AĞIRLIĞI:

İbrahim Toğa ULUŞAN

MACROSAN KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
ONUR MAH. ZAMBAK SK. PALMİTE
NO:39A - 3 BALÇOVA/İZMİR
V.NO: 609072473

Piyasaya sunacağımız bu ürünün üzerindeki etiket bilgilerinin aynıysa olacağını taahhüt ederiz.

Aksini tesbiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yasal işlemleri peşinen kabul ederiz.

EC FERTİLİZER
NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

macrozan
KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

İbrahim Toğa ULUŞAN
MACROZAN KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
ONUR MAH. ZAMBAK SK. PALMİYE
NO:38A - Z BALÇOVA / İZMİR
V.NO: 6050072471

MacroFos-N

5-25-0 + ME

Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot (N).....	%5
Üre Azotu (NH ₂) ₂	%5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅).....	%25
Suda Çözünür Çinko (Zn).....	%5



MacroFos-N

5-25-0 + ME

macrozan
KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Bittki Adı	Yapraktan Uygulama Dozu ve Uygulama Bileşimi
Sulazerler: Domates, Elber, Patlıcan, Hyar, Kabak, Faslıyık, Bezelye, Barmya, Ispenak, Enginer v.s	75-125 gıda Meyve dönemi beşinciğinden hasat sonuna kadar 2-3 uygulama yapılır.
Narenciyeler: Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt v.s	100-150 g/100 L su Çiçeklenme öncesi ilk uygulama yapılır. 30 gün arayla 3 uygulama daha yapılır.
Meyve Ağaçları: Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Badem, Ayne, Nar, Zeytin v.s	100-150 g/100 L su Meyve bağlama, büyüme ve hasat öncesi kadar 2-3 uygulama yapılır.
Çilek, Ahududu, Yaban Mersini	75-125 gıda Çiçek öncesi ve Meyve bağlama döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Fındık, Ceviz, Badem	100-150 g/100 L su Çiçek öncesi, büyüme ve çiçek bağlama döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Muz	100-150 g/100 L su Meyve oluşumu öncesi ve sonrası 2-3 uygulama yapılır.
Bağ (Üzüm)	100-150 g/100 L su Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Hububat: Buğday, Arpa, Çeltik, Mercimek, Nohut v.s	100-150 gıda Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Kavun, Karpuz	100-150 gıda Kol atımından sonra 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.
Pamuk	100-150 gıda Tarak öncesi ve sonrası 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.
Ayçiçeği, Mısır, Tütün, Kanola	100-150 gıda Bittki boyu 20-25 cm oluncaya 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.
Soğan, Sarımsak, Pırasa, Patates, Turp, Şeker Pancarı, Havuç, Lahana, Marul	100-150 gıda Çiçeklenme 15 gün sonra 1-2 uygulama yapılır.
Kesme Çiçekçilik	75-125 gıda Yapılandırma dönemi ve sonrasında 2-3 uygulama yapılır.

Damlı Sulama ve Salma Sulama Sistemleri ile Dekara (0,5-1 kg) Uygulama Yapılır.

Depolama Şartları: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.

Depolama sıcaklığı: +5°C ile +45°C arasında olmalıdır. TAHRİŞ EDİCİDİR.

Kullanıma İlgili Uyarılar: Gözler, deri ve elbiselerinize bulaşmamasına dikkat ediniz. Bulaşması durumunda bol su ve sabunla yıkayınız. Uygulama esnasında hiçbir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz. Ağız yolu ile bulaşma durumunda, zehirlenme belirtileri görülürse hasta kuzurmalı ve doktor çağırılmalıdır. Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

Toprak ve/veya yaprak analizi yapılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla uygun dozlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

Çözünürlüğü ve Karşılabilirliği: Suda tavsiye edilen dozlarda çözünür, çökmez ve kalıntı bırakmaz. Yüksek alkali, yüksek asitli haricinde pestisit ve gübrelere karşıdır. Kullanmadan önce karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.

Firma Beyanı: Üretici firma, tavsiyelere uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak depolama şartları, hatalı kullanım ve karışımından dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisli dışındadır.

macrozan
KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Üretici Firma: MACROZAN KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: Onur Mah. Zambak Sk. No: 38/A Balçova / İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 278 20 49 • www.macrozan.com.tr



Lisans No: • **Tescil No:** XXXXXXXXXX

Son Kullanma Tarihi imal tarihinden itibaren 5 yıldır.

ÜRT:
SKT:
PNO:
NET AĞIRLIĞI:

İbrahim Toğa ULUŞAN
MACROZAN KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
ONUR MAH. ZAMBAK SK. PALMİYE
NO:38A - Z BALÇOVA / İZMİR
V.NO: 6050072471

Piyasaya sunacağımız bu ürünün üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt ederiz. Aksini tesbiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yasal işlemleri peşinen kabul ederiz.