

Bitki Adı

Yapraktan Uygulama Dozu ve Uygulama Biçimi

Selzeler: Domates, Biber, Patlıcan, Hiyar, Kabaak, Fasulye, Bezelye, Berniye, Ispanak, Enginar v.s

150-200 g/da Meyve dönemi başlangıcından hasat sonuna kadar 2-3 uygulama yapılır.

Narenciyeler: Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt v.s

200-300 g/100 L su Çiçeklenme öncesi ilk uygulama yapılır. 30 gün arayla 3 uygulama daha yapılır.

Meyve Ağaçları: Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Badem, Ayva, Nar, Zeytin v.s

200-300 g/100 L su Meyve bağlama, büyüme ve hasat öncesi 2-3 uygulama yapılır.

Çilek, Ahududu, Yaban Mersini

200-300 g/da Çiçek öncesi ve Meyve bağlama döneminde 2-3 uygulama yapılır.

Fındık, Ceviz, Badem

200-300 g/100 L su Çiçek öncesi, tohum atma ve tohumlama döneminde 2-3 uygulama yapılır.

Muz

200-300 g/100 L su Meyve oluşumu öncesi ve sonrası 2-3 uygulama yapılır.

Bağ (üzüm)

200-300 g/100 L su Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır.

Hulubut: Buğday, Arpa, Çeltik, Mercimek, Nohut v.s

200-300 g/da Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır.

Kavun, Karpuz

200-250 g/da Kol atımından sonra 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

Pamuk

200-250 g/da Tarak öncesi ve sonrası 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

Ayoçiçeği, Mısır, Tütün, Kanola

200-250 g/da Bitki boyu 20-25 cm olunca 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

Soğan, Samanık, Prasa, Patates, Turp, Şeker Pancarı, Havuç, Lahana, Marul

200-250 g/da Çapa 15 gün sonra 1-2 uygulama yapılır.

Kesme Çiçekçilik

150-250 g/da Yapraklanma dönemi ve sonrasında 2-3 uygulama yapılır.

Damia Sulama ve Salma Sulama Sistemleri ile Dekara (1-1,5 kg) Uygulama Yapılır.

EC FERTİLİZER

NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

macro

KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Magron

20-5-0 + (3 MgO) + (6 SO3)

Garanti Edilen İçerik

W/W

Toplam Azot (N) %20

Üre Azotu (NH₂) %20

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) %5

Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) %3

Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO₃) %6



Magron

20-5-0 + (3 MgO) + (6 SO3)

Depolama Şartları: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı -5°C ile +45°C arasında olmalıdır. TAHRİŞ EDİCİDİR.**

Kullanım ile ilgili Uyarılar: Gözler, deri ve elbiselerinize bulaşmasından dikkat ediniz. Bulaşması durumunda bol su ve sabunla yıkayınız. Uygulama esnasında hiçbir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz. Ağız yolu ile bulaşma durumunda, zehirlenme belirtileri görülürse hasta kusturulmalı ve doktor çağrılmalıdır. Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. **Toprak ve veya yaprak analizi yapılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla uygun dozlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.**

Çözünürlüğü ve Karşılaşılabilirlik: Suda tavsiye edilen dozlarda çözünür, çökmez ve kalıntı bırakmaz. Yüksek alkali, yüksek asitli haricinde pestisit ve gübrelere karşılaşılır. Kullanmadan önce karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.

Firma Beyanı: Üretici firma, tavsiyelere uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak depolama şartları, hatalı kullanım ve karışımın dolaylı doğabilecek olumsuzluklar firmamızın garantisini dışındadır.

macro

KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Üretici Firma: MACROSAN KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Onur Mah. Zambak Sk. No: 39/A Balçova / İzmir / Türkiye

Tel: +90 232 279 20 49 • www.macroasan.com.tr



Lisans No: - Tescil No: XXXXXXXXXX


Son Kullanma Tarihi imal tarihinden itibaren 5 yıldır.

ÜRT:

SKT:

PND:

NET AĞIRLIĞI:



Piyasaya sunacağımız bu ürünün üzerindeki etiket bilgilerinin aynı olacağını taahhüt ederiz.

Aksini tesbiti halinde 7723 sayılı kanuna göre hakkımızda yasal işlemleri peşinen kabul ederiz.

EC FERTİLİZER
NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

macrosan
KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Magron

20-5-0 + (3 MgO) + (6 S03)

Garanti Edilen İçerik W/W

Toplam Azot (N)	%20
Üre Azotu (NH ₂)	%20
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%5
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	%3
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	%6



Magron

20-5-0 + (3 MgO) + (6 S03)

macrosan
KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

BİTKİ ADI	Yapraktan Uygulama Dozu ve Uygulama BİÇİMİ
Sebzeler: Domates, Biber, Patlıcan, Hyar, Kabak, Fasulye, Bezelye, Bamya, Ispanak, Enginar v.s.	150-200 gr/da Meyve dönemi başlangıcından hasat sonuna kadar 2-3 uygulama yapılır.
Narenciye: Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt v.s.	200-300 gr/100 L su Çiçeklenmeye öncesi ilk uygulama yapılır. 30 gün arayla 3 uygulama daha yapılır.
Meyve Ağaçları: Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Badem, Ayva, Nar, Zeytin v.s.	200-300 gr/100 L su Meyve bağlama, büyüme ve hasat öncesine kadar 2-3 uygulama yapılır.
Çilek, Ahududu, Yaban Mersini	200-300 gr/da Çiçek öncesi ve Meyve bağlama döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Fındık, Ceviz, Badem	200-300 gr/100 L su Çiçek öncesi, büyük atma ve iç bağlama döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Muz	200-300 gr/100 L su Meyve oluşumu öncesi ve sonrası 2-3 uygulama yapılır.
Bağ (üzüm)	200-300 gr/100 L su Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Hububat: Buğday, Arpa, Çeltik, Mercimek, Nohut v.s.	200-300 gr/da Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Kavun, Karpuz	200-250 gr/da Kol atımından sonra 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.
Pamuk	200-250 gr/da Tarak öncesi ve sonrası 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.
Ayçiçeği, Mısır, Tütün, Kanola	200-250 gr/da Bitki boyu 20-25 cm olunca 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.
Soğan, Sarımsak, Prasa, Patates, Turp, Şeker Pancarı, Havuç, Lahana, Marul	200-250 gr/da Çapaadan 15 gün sonra 1-2 uygulama yapılır.
Kesme Çiçekçilik	150-250 gr/da Yapraklanma dönemi ve sonrasında 2-3 uygulama yapılır.

Damlı Sulama ve Salma Sulama Sistemleri İle Dekara (11,5 kg) Uygulama Yapılır.

Depolama Şartları: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.

Depolama sıcaklığı +5°C ile +45°C arasında olmalıdır. TAHRİŞ EDİCİDİR.

Kullanım İlgili Uyarılar: Gözler, deri ve elbiselerinizde buluşmamasına dikkat ediniz. Buluşması durumunda bol su ve sabunla yıkayınız. Uygulama esnasında hiçbir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz. Ağız yolu ile buluşma durumunda, zehirlenme belirtileri görürseniz hasta kurturulmalı ve doktor çağrılmalıdır. Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla uygun dozlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

Çözünürlüğü ve Karşıabilirlik: Suda tavsiye edilen dozlarda çözünür, çökmez ve kalıntı bırakmaz. Yüksek alkali, yüksek asitli haricinde pestisit ve gübrelere karşıabilir. Kullanmadan önce karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.

Firma Beyanı: Üretici firma, tavsiyelere uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak depolama şartları, hatalı kullanım ve karışımın dolaylı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisel dışındadır.

macrosan
KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Üretici Firma: MACROSAN KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Onur Mah. Zambak Sk. No: 39/A Balçova / İzmir / Türkiye

Tel: +90 232 278 20 49 - www.macrosan.com.tr



Lisans No: - Tescil No: XXXXXXXXX

Son Kullanma Tarihi imal tarihinden itibaren 5 yıldır.

ÜRT:

SKT:

PNO:

NET AĞIRLIĞI:

İbrahim Tolga ULUŞAN

MACROSAN KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
ONUR MAH. ZAMBAK SK. PALMİYE
NO:39A - Z BALÇOVA/ İZMİR
V.NO: 6090072471

Piyasaya sunacağımız bu ürünün üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt ederiz. Aksini tesbiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yasal işlemleri peşinen kabul ederiz.