

Bitki Adı

Yapraktan Uygulama Dozu ve Uygulama Bıçımı

Sebzeler: Domates, Biber, Patlıcan, Hiyar, Kabak, Fasulye, Bezelye, Berniye, Ispanak, Enginar v.s

150-200 gıda

Meyve dönemi başlangıcından hasat sonuna kadar 2-3 uygulama yapılır.

Marenciler: Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt v.s

200-250 gr/100 L su

Çiçeklenme öncesi ilk uygulama yapılır, 30 gün arayla 3 uygulama daha yapılır.

Meyve Ağaçları: Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Badem, Ayva, Nar, Zeytin v.s

200-250 gr/100 L su

Meyve bağlama, büyüme ve hasat öncesi kadar 2-3 uygulama yapılır.

Çilek, Ahududu, Yaban Mersini

150-200 gıda

Çiçek öncesi ve Meyve bağlama döneminde 2-3 uygulama yapılır.

Fındık, Ceviz, Badem

200-250 gr/100 L su

Çiçek öncesi, bıyık atma ve çiçeklenme döneminde 2-3 uygulama yapılır.

Muz

200-250 gr/100 L su

Meyve oluşumu öncesi ve sonrası 2-3 uygulama yapılır.

Bağ (üzüm)

200-250 gr/100 L su

Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır.

Hububat: Buğday, Arpa, Çeltik, Mercimek, Nohut v.s

200-250 gıda

Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır.

Kavun, Karpuz

200-250 gıda

Kol atımından sonra 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

Pamuk

200-250 gıda

Tarak öncesi ve sonrası 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

Ayçiçeği, Mısır, Tütün, Kanola

200-250 gıda

Bitki boyu 20-25 cm olunca 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

Soğan, Sarımsak, Pırasa, Patates, Turp, Şeker Pancarı, Havuç, Lahana, Marul

200-250 gıda

Çapaktan 15 gün sonra 1-2 uygulama yapılır.

Kesme Çiçekçilik

150-200 gıda

Yapraklanma dönemi ve sonrasında 2-3 uygulama yapılır.

Damla Sulama ve Salma Sulama Sistemleri ile Dekara (1-1,5 kg) Uygulama Yapılır.

POTASYUM ÇÖZELTİSİ


macro

KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Nutrapot

Garanti Edilen İçerik W/W

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) %25



Nutrapot

Depolama Şartları: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı -5°C ile +45°C arasında olmalıdır.**

Kullanım ile ilgili Uyarılar: Gözler, deri ve elbiselerimize bulaşmasına dikkat ediniz. Bulaşması durumunda bol su ve sabunla yıkayınız. Uygulama esnasında hiçbir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz. Ağız yolu ile bulaşma durumunda, zehirlenme belirtileri görürse hasta kusturulmalı ve doktor çağrılmalıdır. Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. **Toprak ve veya yaprak analizi yapılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla uygun dozlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.**

Çözünürlüğü ve Karışabilirlik: Suda tavsiye edilen dozlarda çözünür, çökmez ve kalıntı bırakmaz. Yüksek alkali, yüksek asitli haricinde pestisit ve gübrelerle karışabilir. Kullanmadan önce karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.

Firma Beyanı: Üretici firma, tavsiyelere uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak depolama şartları, hatalı kullanımı ve karışımın dolaylı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisine dışındadır.

macro

KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Üretici Firma: MACROSAN KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Onur Mah. Zambak Sk. No: 39/A Balçova / İzmir / Türkiye

Tel: +90 232 279 20 49 • www.macro.com.tr



Lisans No: • **Tescil No:** XXXXXXXXXX

Son Kullanma Tarihi imal tarihinden itibaren 5 yıldır.

ÜRT:

SKT:

PNO:

NET AĞIRLIĞI:

Piyasaya sunacağımız bu ürünün üzerindeki etiket bilgilerinin aynı olacağını taahhüt ederiz.

Aksini tesbiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yasal işlemleri peşinen kabul ederiz.

macrosan
KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.



Nutrapot




Nutrapot



macrosani
KIMYA SANAYI TIC. LTD. STI.

BİTKİ ADI	Yaprağın Uygulama Dozu ve Uygulama Bıçığı
Selbazar; Domates, Biber, Patlıcan, Hyar, Kabak, Fasulye, Bezelye, Bamya, Ispanak, Enginar v.s	200-250 g/da Meyve dönemi başlangıcından hasat sonuna kadar 2-3 uygulama yapılır.
Narençiyer; Portakal, Limon, Mandarın, Greyfurt v.s	200-250 g/100 L su Çiçeklenme öncesi 113 L uygulamaya yapılır. 30 gün araya 3 uygulamaya daha yapılır.
Meyve Ağacılar; Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Badem, Ayne, Nar, Zeytin v.s	200-250 g/100 L su Meyve bağlama, büyüme ve hasat öncesine kadar 2-3 uygulamaya yapılır.
Çilek, Ahududu, Yaban Mersini	200-250 g/da Çiçek öncesi ve Meyve bağlama döneminde 2-3 uygulamaya yapılır.
Fındık, Ceviz, Badem	200-250 g/100 L su Çiçek öncesi, büyüme ve çiçek bağlama döneminde 2-3 uygulamaya yapılır.
Muz	200-250 g/100 L su Meyve olgunma öncesi ve sonrası 2-3 uygulamaya yapılır.
Bağ (Üzüm)	200-250 g/100 L su Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulamaya yapılır.
Hububat; Buğday, Arpa, Çeltik, Mercimek, Nohut v.s	200-250 g/da Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulamaya yapılır.
Kavun, Karpuz	200-250 g/da Kıl atımından sonra 15 gün ara ile 2-3 uygulamaya yapılır.
Parmak	200-250 g/da Tarak öncesi ve sonrası 15 gün ara ile 2-3 uygulamaya yapılır.
Ayçiçeği, Mısır, Tütün, Kanola	200-250 g/da BİTKİ boyu 20-25 cm olunca 15 gün ara ile 2-3 uygulamaya yapılır.
Soğan, Sarımsak, Pırasa, Patates, Turp, Şeker Pancarı, Havuç, Lahana, Marul	200-250 g/da Çapadan 15 gün sonra 1-2 uygulamaya yapılır.
Kesme Çiçekçilik	150-200 g/da Yapraklanma dönemi ve sonrasında 2-3 uygulamaya yapılır.

İbrahim Tolga ULUŞAN
MACROBAN KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
ONUR MAH. ZAMBAK SK. PALMIYE
NO:39A - Z BALÇOVA/İZMİR
V.NO: 6090072471

Piyasaya sunacağımız bu ürünün üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt ederiz. Aksini tesbiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yasal işlemleri peşinen kabul ederiz.