

Bitki Adı

Yapraktan Uygulama Dozu ve Uygulama Bıçımı

Selzeler: Domates, Biber, Patlıcan, Hiyar, Kabak, Fasulye, Bezelye, Berniye, Ispanak, Enginar v.s

150-200 gıda

Meyve dönemi başlangıcından hasat sonuna kadar 2-3 uygulama yapılır.

Narenciyeler: Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt v.s

200-250 gr/100 L su

Çiçeklenme öncesi ilk uygulama yapılır, 30 gün arayla 3 uygulama daha yapılır.

Meyve Ağaçları: Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Badem, Ayva, Nar, Zeytin v.s

200-250 gr/100 L su

Meyve bağlama, büyüme ve hasat öncesi kadar 2-3 uygulama yapılır.

Çilek, Ahududu, Yaban Mersini

150-200 gıda

Çiçek öncesi ve Meyve bağlama döneminde 2-3 uygulama yapılır.

Fındık, Ceviz, Badem

200-250 gr/100 L su

Çiçek öncesi, bıyık atma ve çiçeklenme döneminde 2-3 uygulama yapılır.

Muz

200-250 gr/100 L su

Meyve oluşumu öncesi ve sonrası 2-3 uygulama yapılır.

Bağ (üzüm)

200-250 gr/100 L su

Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır.

Hulubut: Buğday, Arpa, Çeltik, Mercimek, Nohut v.s

200-250 gıda

Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır.

Kavun, Karpuz

200-250 gıda

Kol atımından sonra 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

Pamuk

200-250 gıda

Tarak öncesi ve sonrası 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

Ayçiçeği, Mısır, Tütün, Kanola

200-250 gıda

Bitki boyu 20-25 cm olunca 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

Soğan, Sarmısak, Pırasa, Patates, Turp, Şeker Pancarı, Havuç, Lahana, Marul

200-250 gıda

Çapatdan 15 gün sonra 1-2 uygulama yapılır.

Kesme Çiçekçilik

150-200 gıda

Yapraklanma dönemi ve sonrasında 2-3 uygulama yapılır.

Damla Sulama ve Salma Sulama Sistemleri ile Dekara (1-1.5 kg) Uygulama Yapılır.

EC FERTİLİZER NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

macrosan

KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Potassate-N³⁻⁰⁻³⁰

Garanti Edilen İçerik

Toplam Azot (N) %3

Üre Azotu (NH₂) %3

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) %30



Potassate-N³⁻⁰⁻³⁰

Depolama Şartları: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.

Depolama sıcaklığı: +5°C ile +45°C arasında olmalıdır.

Kullanım ile ilgili Uyarılar: Gözler, deri ve elbiselerimize bulaşmamasına dikkat ediniz. Bulaşması durumunda bol su ve sabunla yıkayınız. Uygulama esnasında hiçbir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz. Ağız yolu ile bulaşma durumunda, zehirlenme belirtileri görürse hasta kusturulmalı ve doktor çağrılmalıdır. Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. **Toprak ve veya yaprak analizi yapılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla uygun dozlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.**

Çözünürlüğü ve Karışabilirliği: Suda tavsiye edilen dozlarda çözünür, kökmez ve kalıntı bırakmaz. Yüksek alkali, yüksek asitli haricinde pestisit ve gübrelerle karışabilir. Kullanmadan önce karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.

Firma Beyanı: Üretici firma, tavsiyelere uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak depolama şartları, hatalı kullanımı ve karışımın dolaylı doğabilecek olumsuzluklar firmamızın garantisidir.

macrosan

KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Üretici Firma: MACROSAN KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Onur Mah. Zambak Sk. No: 39/A Balçova / İzmir / Türkiye

Tel: +90 232 279 20 49 • www.macrospan.com.tr



Lisans No: - Tescil No: XXXXXXXXXX


Son Kullanma Tarihi imal tarihinden itibaren 5 yıldır.

ÜRT:

SKT:

PNO:

NET AĞIRLIĞI:



Piyasaya sunacağımız bu ürünün üzerindeki etiket bilgilerinin aynı olacağını taahhüt ederiz. Aksini tesbiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yasal işlemleri peşinen kabul ederiz.

EC FERTİLİZER
NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

macrosan
KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Potassate-N

3-0-30

Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot (N)	%3
Üre Azotu (NH ₂) ₂	%3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%30



Potassate-N

3-0-30

macrosan
KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

BİTKİ ADI	Yapraktan Uygulama Dozu ve Uygulama BİÇİMİ
Sebzeler: Domates, Elber, Patlıcan, Hıyar, Katak, Fasulye, Bezelye, Barmya, Ispanak, Enginar v.s.	200-250 g/100 L su Meyve dönemi başlangıcından hasat sonuna kadar 2-3 uygulama yapılır.
Narenciye: Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt v.s.	200-250 g/100 L su Çiçeklenme öncesi ilk uygulama yapılır. 30 gün arayla 3 uygulama daha yapılır.
Meyve Ağaçları: Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Badem, Ayne, Nar, Zeytin v.s.	200-250 g/100 L su Meyve bağlama, büyüme ve hasat öncesine kadar 2-3 uygulama yapılır.
Çilek, Ahududu, Yaban Mersini	200-250 g/100 L su Çiçek öncesi ve Meyve bağlama döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Fındık, Ceviz, Badem	200-250 g/100 L su Çiçek öncesi, briket atma ve iç bağlama döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Muz	200-250 g/100 L su Meyve oluşumu öncesi ve sonrası 2-3 uygulama yapılır.
Bağ (Özüm)	200-250 g/100 L su Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Hüthut: Buğday, Arpa, Çeltik, Mercimek, Nohut v.s.	200-250 g/100 L su Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Kavun, Karpuz	200-250 g/100 L su Kol atımından sonra 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.
Pamuk	200-250 g/100 L su Tarak öncesi ve sonrası 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.
Ayçiçeği, Mısır, Tütün, Kanola	200-250 g/100 L su Bitki boyu 20-25 cm olunca 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.
Soğan, Sarımsak, Piraz, Patates, Turp, Şeker Pancarı, Havuç, Lahana, Marul	200-250 g/100 L su Çapadan 15 gün sonra 1-2 uygulama yapılır.
Kesme Çiçekçilik	150-200 g/100 L su Yapılandırma dönemi ve sonrasında 2-3 uygulama yapılır.

Damlı Sulama ve Salma Sulama Sistemleri ile Dekara (1-1,5 kg) Uygulama Yapılır.

Depolama Şartları: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.

Depolama sıcaklığı: +5°C ile +45°C arasında olmalıdır.

Kullanıma İlgili Uyarılar: Gözler, deri ve elbiselerinize bulaşmamasına dikkat ediniz. Bulaşması durumunda bol su ve sabunla yıkayınız. Uygulama esnasında hiçbir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz. Ağız yolu ile bulaşma durumunda, zehirlenme belirtileri görülürse hasta kusturulmalı ve doktor çağırılmalıdır. Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

Toprak ve/veya yaprak analizi yapılmadan gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla uygun dozlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

Çözünürlüğü ve Karşıabilirlik: Suda tavsiye edilen dozlarda çözünür, çökmez ve kalıntı bırakmaz. Yüksek alkali, yüksek asitli haricinde pestisit ve gübrelerle karşıabilir. Kullanmadan önce karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.

Firma Beyanı: Üretici firma, tavsiyelere uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak depolama şartları, hatalı kullanım ve karışımın dolaylı doğabilecek olumsuzlukları firmamızın garantisidir.

macrosan
KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Üretici Firma: MACROSAN KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Onur Mah. Zambak Sk. No: 39/A Balçova / İzmir / Türkiye

Tel: +90 232 279 20 49 - www.macrosan.com.tr



Lisans No: - **Tescil No:** XXXXXXXXXX

Son Kullanma Tarihi imal tarihinden itibaren 5 yıldır.

ÜRT:

SKT:

PNO:

NET AĞIRLIĞI:

İbrahim Tolga ULUŞAN

MACROSAN KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
ONUR MAH. ZAMBAK SK. PALMİYE
NO: 39A - Z BALÇOVA/ İZMİR
V.NO: 6090072471

Piyasaya sunacağımız bu ürünün üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt ederiz. Aksini tesbiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yasal işlemleri peşinen kabul ederiz.